РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС

НАЗАРОВА Н.М., ПАВЛОВИЧ С.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Москва, Россия

Шифр по МКБ-10

А60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция
А60.0 Герпетическая инфекция половых органов и мочеполового тракта
А60.1 Герпетическая инфекция перианальных кожных покровов и прямой кишки

Клинические проявления: на фоне эритемы сгруппированные везикулы диаметром до 3–4 мм с серозным содержимым, через несколько дней содержимое пузырьков мутнеет, они вскрываются и образуют эрозии; высыпания чаще локализуются на половых губах (60–80%), слизистой влагалища (27–38%), шейки матки (12–88%), преддверия влагалища (27–38%), на коже промежности (8–17%), вокруг ануса и на ягодицах.



ООО "БИОНИКА МЕДИА"

Лечение рецидивирующего генитального герпеса

Показания: наличие клинических проявлений генитального герпеса

Эпизодическая терапия:

- ацикловир 200 мг перорально 5 раз в сутки в течение 5 дней

или

- ацикловир 400 мг перорально 3 раза в сутки в течение 5 дней

или

- ацикловир 800 мг перорально 3 раза в сутки в течение 2 дней

или

- валацикловир 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней

или

- валацикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня

или

- фамцикловир 125 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 дней

или

- фамцикловир 1,0 г перорально 2 раза в сутки в течение 1 дня
- **Местно:** активированная глицирризиновая кислота (спрей Эпиген Интим). Наружно и интравагинально 5 раз в день – 14 дней, после купирования рецидива – 3 раза в день 10 дней

Показания: тяжелое течение, с частыми рецидивами (более 6 раз в год) и осложнениями

Супрессивная терапия:

- валацикловир 500 мг 1 раз в сутки перорально

или

- фамцикловир 250 мг 2 раза в сутки перорально

или

- ацикловир 400 мг 2 раза в сутки перорально
- **Местно:** активированная глицирризиновая кислота (спрей Эпиген Интим) наружно и интравагинально с 18–20 дня менструального цикла до окончания менструации 2 раза в день

Длительность супрессивной терапии определяется индивидуально (минимальный курс – 4 мес)

ООО "БИОНИКА МЕДИА"



Литература

1. Диагностика инфекций в акушерско-гинекологической и неонатологической практике. Учебное пособие. Коллектив авторов. М., 2018. 124 с.
2. Инфекции, передающиеся половым путем / Клинические лекции под ред. В.Н. Прилепской. Коллектив авторов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
3. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted DiseasesTreatment Guidelines, 2015.
4. European guidelines for the management of genital herpes, 2017.
5. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. М., 2016. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой экспресс, 2016. 768 с.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата Эпиген Интим, спрей 0,1 % для наружного и местного применения.
7. *Павлович С.В., Назарова Н.М.* Генитальный герпес у женщин вне и во время беременности. Медсовет. 2018; 13:61-64

ООО "БИОНИКА МЕДИА"

Помогает сохранить интимное здоровье женщины

Эпиген Интим

СПРЕЙ для наружного и местного применения 0,1%
Действующее вещество – глицирризиновая кислота **активированная**
Форма выпуска: флаконы 60 мл и 15 мл

Спрей Эпиген Интим –
местное средство с прямым противовирусным, противовоспалительным и регенерирующим эффектом

Обладает активностью в отношении вируса папилломы человека, герпесвируса 1 и 2 типа, цитомегаловируса

Разрешен к применению **на всех сроках беременности** и лактации

Укомплектован **специальной вагинальной насадкой** для равномерного орошения влагалища и шейки матки

Произведено по заказу «Хемигруп Франс С.А.», Франция для ООО «Инвар», Россия

www.epigen.ru www.invar.ru

Реклама

ООО "БИОНИКА МЕДИА"